

مُخَدِّر عام: خطر و آثار جانبية

يختلف كل شخص عن الآخر و يصعب معرفة من سيواجه آثارًا جانبية أو خطر. قد يكون بعضها أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم حالات صحية سابقة أو يحتاجون إلى إجراء جراحة معينة.

الأرقام الواردة أدناه هي معدلات متوسطة من أبحاث. الأفراد في هذه الدراسات, أجروا عمليات جراحة روتينية, و تمتعوا بوزن صحي, و لم تكن لديهم مشكلات صحية معينة.

يمكنك معرفة المزيد عن أبحاث الذي استخدمناه هنا: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence

قد تكون درجة خطر لديك متفاوتة, إما أعلى أو أقل من هذه النسب. سيتناول طبيب التخدير معك خطر التي قد تكون ذات صلة أكبر بحالتك الصحية.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول التخدير على موقعنا الإلكتروني والمتاح بعدة لغات مختلفة: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages

هذه الأرقام تعبر عن عدد الحالات من كل 100 شخص.

ما الذي حدث؟	إلى أي مدة؟	كم العدد؟ من كل 100 شخص (مائة شخص)
ارتعاش 	لمدة 20-30 دقيقة في غرفة التعافي	15 فعل 85 لم يفعل
غثيان (الشعور بالغثيان) 	لمدة 1-24 ساعة	حوالي 15 حوالي 85
التهاب الحلق 	لمدة 24-48 ساعة	40-20 80-60 يعتمد على نوع أنبوب التنفس المستخدم
كدمات أو ألم من الحقنة 	يزول في غضون أيام قليلة	10 90

	الإصابة الطفيفة في الشفة أو اللسان يشفى في بضعة أيام	
99-95	5-1	
	التهاب صدي لأيام أو أسابيع	
80	20	
	الشعور بالارتباك (الذهيان) لأيام وأسابيع أو أشهر	
90-50	50-10	

الخطر التالي نادر الحدوث.
تستند هذه الأرقام إلى كل 10,000 شخص.

ما الذي حدث؟	إلى أي مدة؟	كم العدد؟ من بين كل 10,000 شخص (عشرة آلاف شخص)
أضرار على مستوى الأسنان 	يحتاج إلى أن يُفحص من قبل طبيب الأسنان	5
9,995		
تَعْيِمُ الرؤية أو تهيج العين أو ألمها بسبب خدش صغير أو جفاف العينين.	بضعة أيام	حوالي 5
حوالي 9,995		
الوخز أو تنميل أو الألم أو الضعف (تلف الأعصاب).	مؤقتة (من أسابيع إلى أشهر)	5-1
9,999-9,995		
رد الفعل التحسسي الشديد (الحساسية المفرطة)	يحدث بسرعة تم علاجه على الفور	1
9,999		
السكتة القلبية، مثل توقف القلب أثناء الجراحة	تم علاجه على الفور	3
9,997		

ما الذي حدث؟	كم العدد؟ من بين كل 100,000 شخص (مائة ألف شخص)
استيقظت لفترة قصيرة أثناء التخدير العام (وعي غير مقصود)	5 كانوا 3 إلى 4 من كل 100,000 شخص ذكروا إن ذلك استمر أقل من خمس دقائق، قبل الجراحة أو بعد انتهائها. حوالي 1 من كل 100,000 شخص ذكروا أنهم شعروا ببعض الألم.
فقدوا بصرهم (أصيبوا بالعمى) بسبب الضغط أو الجلطات الدموية التي تؤثر على العصب البصري.	1 99,999
الوفاة بسبب مضاعفات الجراحة	14 99,986
توفيت بسبب سكتة قلبية أثناء الجراحة أو بعدها مباشرة	1 99,999
الوفاة بسبب المخدر	1 99,999
يتفاوت هذا الخطر بشكل كبير. على سبيل المثال، تكون نسبة الوفاة أعلى بالنسبة لبعض العمليات الجراحية، أو إذا كان الأشخاص ضعفاء أو كبار السن أو يعانون من حالات صحية معينة.	

تنويه

إننا نبذل جهودنا في التحديث المستمر لمعلومات هذه النشرة والحفاظ على دقتها، ومع هذا لا يمكننا ضمان بقائها كذلك. من المتوقع ألا تغطي تلك المعلومات العامة جميع الأسئلة لديكم أو تتناول جميع الأمور التي قد تهتمكم. عليكم مناقشة اختياراتكم وأي مخاوف لديكم مع فريقكم الطبي، باستخدام هذه النشرة كدليل. ولا ينبغي التعامل مع هذه النشرة بمفردها كمشورة. لا يمكن استخدام هذه النشرة لأي أغراض تجارية. للاطلاع على بيان إخلاء المسؤولية بالكامل، يرجى النقر هنا (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic)

جميع أعمال الترجمة مقدمة من مجتمع المترجمين التابع لمنظمة مترجمون بلا حدود (Translators without Borders). تم التحقق من جودة أعمال الترجمة هذه بأفضل دقة ممكنة، لكن يحتمل وجود أخطاء أو سوء تفسير لبعض المعلومات.

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

© 2024 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

يُسمح بنسخ هذا الكتيب بغرض توفير مواد معلومات المريض. يرجى ذكر المصدر الأصلي. إذا كنت ترغب في استخدام جزء من هذه النشرة في إصدار آخر، فيجب تقديم الإقرار المناسب وإزالة الشعارات والعلامات التجارية والصور والرموز. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا.