

Anestesia geral:

Riscos e efeitos secundários

Todas as pessoas são diferentes e não é possível saber quem irá sofrer um efeito secundário ou um risco. Alguns são mais prováveis em pessoas com problemas de saúde existentes ou que necessitam de determinadas cirurgias.


Os números abaixo são médias oriundas de estudos de investigação. As pessoas que participaram nos estudos foram geralmente submetidas a cirurgias de rotina, tinham um peso saudável e não sofriam de problemas de saúde específicos.


Pode obter mais informações sobre a investigação que utilizámos aqui: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Os seus riscos podem ser superiores ou inferiores a estes números. O seu anestesista discutirá consigo os riscos que são mais prováveis ou significativos para si.

Pode encontrar informações sobre os diferentes tipos de anestesia no nosso site, que está disponível em várias línguas aqui: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Estes números referem-se a cada 100 pessoas.

O que aconteceu?	Por quanto tempo?	Quantas? Em cada 100 pessoas (cem pessoas)
 Tremores	Por 20-30 minutos na sala de recobro	 15 tiveram 85 não tiveram
 Náuseas (sensação de enjojo)	Por 1-24 horas	 Cerca de 15 tiveram Cerca de 85 não tiveram
 Dores de garganta	Por 24-48 horas	 20-40 tiveram 60-80 não tiveram Depende do tipo de tubo endotraqueal utilizado
 Hematomas ou dores devido a injeções.	Desaparecem em alguns dias	 10 tiveram 90 não tiveram

	Pequenas lesões nos lábios ou língua	Saram em alguns dias	
			1-5 tiveram 95-99 não tiveram
	Infeção pulmonar	Durante dias ou semanas	
			20 tiveram 80 não tiveram
	Estado de confusão mental (delírio)	Durante dias, semanas ou meses	
			10-50 tiveram 50-90 não tiveram

Os riscos que se seguem são raros.

Estes números referem-se a cada 10,000 pessoas.

O que aconteceu?	Por quanto tempo?	Quantas? A cada 10.000 pessoas (dez mil pessoas)
 Danos aos dentes	Precisa de ser visto por um dentista	5 tiveram 9.995 não tiveram
 Visão turva, irritação ou dor ocular devido a um pequeno arranhão ou olhos secos.	Alguns dias	Cerca de 5 tiveram Cerca de 9.995 não tiveram
 Formigueiro, dormência, dor ou fraqueza (lesão do nervo).	Temporário (semanas a meses)	1-5 tiveram 9.995-9.999 não tiveram
	Permanente	1 teve 9.999 não tiveram
 Reação alérgica grave (anafilaxia)	Acontece rapidamente Tratada imediatamente	1 teve 9.999 não tiveram
 Paragem cardíaca, por exemplo, paragem cardíaca durante a cirurgia	Tratada imediatamente	3 tiveram 9.997 não tiveram

Estes números referem-se a cada 100,000 pessoas.

O que aconteceu?	Quantas? A cada 100.000 pessoas (cem mil pessoas)
 <p>Acordou por um curto período de tempo durante a anestesia geral (consciência accidental)</p>	<p>5 tiveram 99.995 não tiveram</p> <p>3-4 a cada 100.000 disseram que durou menos de cinco minutos, antes da cirurgia ou depois de esta ter terminado.</p> <p>Cerca de 1 a cada 100.000 pessoas afirmou ter sentido alguma dor.</p>
 <p>Perderam a visão (ficaram cegos) devido a pressão ou coágulos sanguíneos que afetam o nervo ótico.</p>	<p>1 teve 99.999 não tiveram</p>
 <p>Faleceu devido a complicações da cirurgia</p> <p>Faleceu devido a paragem cardíaca durante ou imediatamente após a cirurgia</p> <p>Morreu devido a anestésico</p> <p>Este risco é muito variável. Por exemplo, é mais elevado para determinadas cirurgias, ou se as pessoas forem frágeis, mais velhas ou tiverem determinadas condições de saúde.</p>	<p>14 tiveram 99.986 não tiveram</p> <p>1 teve 99.999 não tiveram</p> <p>1 teve 99.999 não tiveram</p>

Limitação de responsabilidade

Esforçamo-nos para manter a informação deste folheto precisa e atualizada, porém não nos responsabilizamos por isso. Não esperamos que esta informação genérica abranja todas as dúvidas que possa ter nem que aborde tudo o que possa ser importante para si. Deve falar com a sua equipa médica sobre as suas escolhas e quaisquer preocupações que tenha, utilizando este folheto como um guia. Este panfleto em si só não deve ser usado como guia de aconselhamento. Não pode ser usado para quaisquer fins comerciais nem empresariais. Para ler a exclusão e limitação de responsabilidade completa, acesse (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese).

Todas as traduções são fornecidas pela comunidade de tradutores da Translators Without Borders. A qualidade destas traduções é controlada para que sejam tão precisas quanto possível, embora haja o risco de informação imprecisa ou má interpretação desta.

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

© 2024 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

Estas informações podem ser copiadas com a finalidade de produzir materiais de informação para pacientes. Por favor, cite esta fonte original. Se desejar utilizar parte destas informações noutra publicação, deve ser dado o devido reconhecimento e os logótipos, marcas, imagens e ícones devem ser removidos. Para mais informações, por favor, contacte-nos.