

Anestezice generale:

Riscuri și efecte secundare

Fiecare persoană este diferită și nu se poate ști cine se va confrunta cu un efect secundar sau cu un risc. Persoanele care au probleme de sănătate preexistente sau care au nevoie de anumite intervenții chirurgicale sunt mai predispuse la aceste riscuri.

Valorile de mai jos reprezintă media rezultată din studii de cercetare. Majoritatea persoanelor din cadrul studiilor au suferit intervenții chirurgicale de rutină, aveau o greutate optimă și nu prezentau afecțiuni medicale particulare.

Puteți afla mai multe despre studiile pe care le-am folosit de aici:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Riscurile pot fi mai mari sau mai mici decât aceste valori în cazul dumneavoastră. Medicul anestezist va discuta cu dumneavoastră despre riscurile probabile, sau semnificative, în cazul dumneavoastră.

Puteți afla mai multe informații despre diferitele tipuri de anestezie de pe site-ul nostru, care este disponibil în mai multe limbi aici: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Aceste valori sunt raportate la 100 de persoane.

Ce s-a întâmplat?	Pentru cât timp?	Câte persoane? Din 100 de persoane (o sută de persoane)
 Frisoane	Timp de 20-30 de minute în salonul de recuperare	 15 da 85 nu
 Greață (senzație de rău)	Timp de 1-24 de ore	 Aproximativ 15 da Aproximativ 85 nu
 Durere în gât	Timp de 24-48 de ore	 20-40 da 60-80 nu În funcție de tubul de respirație folosit
 Vânătăi sau durere de la injecții.	Dispar în câteva zile	 10 da 90 nu

	Leziune minoră la nivelul buzelor sau al limbii	Se vindecă în câteva zile		1-5 da	95-99 nu
	Infecție toracică	Timp de câteva zile sau săptămâni		20 da	80 nu
	Persoana devine confuză (delir)	Timp de câteva zile, săptămâni sau luni		10-50 da	50-90 nu

Riscurile de mai jos sunt rare.

Aceste valori sunt raportate la 10.000 de persoane.

Ce s-a întâmplat?	Pentru cât timp?	Câte persoane? Din 10.000 de persoane (zece mii de persoane)	
 Deteriorarea dinților	Necesită consult stomatologic	5 da	9.995 nu
 Vedere încețoșată, iritații sau dureri oculare din cauza unei zgârieturi mici sau a ochilor uscați.	Câteva zile	Aproximativ 5 da	Aproximativ 9.995 nu
 Furnicături, amorțeală, durere sau slăbiciune (leziuni ale nervilor).	Temporar (săptămâni sau luni)	1-5 da	9.995-9.999 nu
	Permanent	1 da	9.999 nu
 Reacție alergică severă (anafilaxie)	Instalată rapid Tratată imediat	1 da	9.999 nu
 Stop cardiac, de exemplu oprirea inimii în timpul intervenției chirurgicale	Tratată imediat	3 da	9.997 nu

Aceste valori sunt raportate la 100.000 de persoane.

Ce s-a întâmplat?	Câte persoane? Din 100.000 de persoane (o sută de mii de persoane)
 S-au trezit pentru o perioadă scurtă de timp în timpul anestezicului general (au devenit conștienți în mod accidental)	5 da 99.995 nu 3-4 din 100.000 au afirmat că a durat mai puțin de cinci minute, înainte de intervenția chirurgicală sau după terminarea acesteia. Aproximativ 1 din 100.000 a afirmat că a simțit o oarecare durere.
 Și-au pierdut vederea (au orbit) din cauza presiunii sau a cheagurilor de sânge care au afectat nervul optic.	1 da 99.999 nu
 Au decedat din cauza complicațiilor intervenției chirurgicale	14 da 99.986 nu
Au decedat din cauza unui stop cardiac în timpul sau imediat după intervenția chirurgicală	1 da 99.999 nu
Au decedat din cauza anestezicului	1 da 99.999 nu
Acest risc variază foarte mult. De exemplu, este mai mare în cazul anumitor intervenții chirurgicale sau dacă persoanele erau slăbite, mai în vârstă sau aveau anumite probleme de sănătate.	

Declinarea responsabilității

Ne străduim din răputeri să menținem informațiile din această broșură exacte și actualizate, dar nu putem garanta acest lucru. Nu ne așteptăm ca aceste informații generale să ofere răspuns la toate întrebările pe care le-ați putea avea sau să trateze tot ceea ce poate fi important pentru dumneavoastră. Ar trebui să discutați cu echipa medicală despre opțiunile dumneavoastră și despre orice îngrijorare pe care o aveți, folosind această broșură ca ghid. Această broșură în sine nu trebuie considerată drept îndrumar. Nu poate fi utilizată în scopuri comerciale sau de afaceri. Pentru precizări legale complete, vă rugăm să faceți clic aici (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian).

Toate traducerile sunt furnizate de comunitatea de traducători Translators Without Borders (Traducători fără frontiere). Calitatea acestor traduceri este verificată pentru a obține traduceri cât mai exacte, dar există riscul de inexactități și de interpretare greșită a unor informații.

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

© 2024 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

Aceste informații pot fi copiate în scopul producerii de materiale informative pentru pacienți. Vă rugăm să citați sursa originală. Dacă doriți să utilizați o parte din aceste informații într-o altă publicație, trebuie să specificați sursa în mod corespunzător și să eliminați elementele grafice, mărcile, imaginile și pictogramele. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.