

Препараты общей анестезии

Риски и побочные эффекты

Все люди разные, поэтому невозможно предугадать, кто может быть подвержен побочным эффектам или риску для здоровья. С большей вероятностью они могут возникнуть у людей с нарушениями здоровья или имеющих показания к определенным операциям.



Приведенные ниже цифры являются средними показателями, полученными в ходе научных исследований. Участники исследований перенесли плановые операции, находились в здоровом весе и не имели сопутствующих заболеваний.

Ознакомиться с исследованиями, на которые мы ссылаемся, можно здесь:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Ваши показатели риска могут быть выше или ниже этих цифр. Анестезиолог обсудит с вами риски, которые наиболее вероятны или значительны для вас.

Информацию о различных типах анестезии вы можете найти на нашем сайте, который доступен на разных языках: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Данные цифры являются показателями на каждые 100 человек.

Что происходит?	Как долго длится?	У скольких возникло? Из каждых 100 человек (ста человек)
 Дрожь	В течение 20–30 минут в палате послеоперационного наблюдения	 У 15 было У 85 не было
 Тошнота	В течение 1–24 часов	 У около 15 было У около 85 не было
 Боль в горле	В течение 24–48 часов	 У 20–40 было У 60–80 не было В зависимости от типа используемой эндотрахеальной трубки

	Образование синяков или боль от инъекций	Проходит в течение нескольких дней		У 10 было	У 90 не было
	Незначительные повреждения губ или языка	Проходит в течение нескольких дней		У 1–5 было	У 95–99 не было
	Инфекция дыхательных путей	В течение нескольких дней или недель		У 20 было	У 80 не было
	Спутанность сознания (делирий)	На протяжении нескольких дней, недель или месяцев		У 10–50 было	У 50–90 не было

Перечисленные ниже риски встречаются редко.

Данные цифры являются показателями на каждые 10 000 человек.

Что происходит?	Как долго длится?	У скольких возникло? Из каждых 10 000 человек (десяти тысяч человек)	
 Повреждение зубов	Необходима консультация стоматолога	У 5 было	У 9995 не было
 Расфокусированное зрение, раздражение или боль в глазах из-за небольших повреждений или сухости глаз	В течение нескольких дней	У около 5 было	У около 9995 не было
 Покалывание, онемение, боль или слабость (повреждение нерва)	Временно (недели или месяцы) Постоянно	У 1–5 было У 1 было	У 9995–9999 не было У 9999 не было
 Тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия)	Происходит быстро Оказание помощи происходит немедленно	У 1 было	У 9999 не было
 Сердечный приступ, например, остановка сердца во время операции	Оказание помощи происходит немедленно	У 3 было	У 9997 не было

Данные цифры являются показателями на каждые 100 000 человек.

Что происходит?		У скольких возникло? Из каждых 100 000 человек (ста тысяч человек)	
	Кратковременное пробуждение во время общей анестезии (случайное пробуждение)	У 5 было	У 99 995 не было
		3–4 человека из 100 000 заявили, что это длилось менее пяти минут до начала операции или после ее окончания. Примерно 1 из 100 000 человек заявил, что чувствовал боль.	
	Потеря зрения (слепота) из-за давления или тромбов, поражающих зрительный нерв	У 1 было	У 99 999 не было
	Смерть от осложнений после операции	У 14 было	У 99 986 не было
	Смерть от сердечного приступа во время или сразу после операции	У 1 было	У 99 999 не было
	Смерть от анестезии	У 1 было	У 99 999 не было
Показатели по данной группе риска сильно различаются. Например, вероятность может быть выше при определенных хирургических операциях, либо при наличии слабости, определенных проблем со здоровьем или у людей пожилого возраста.			

Заявление об отказе от ответственности

Мы очень стараемся, чтобы информация, предоставленная в данном буклете, была точной и актуальной, однако мы не можем этого гарантировать. Мы не обещаем, что эта общая информация охватит все возникающие у вас вопросы или будет связана со всем, что важно для вас. Вы должны обсудить ваш выбор и любые переживания, возникшие у вас, с вашей медицинской командой, используя данный буклет в качестве руководства. Данная брошюра сама по себе не должна рассматриваться как совет. Она не может быть использована в коммерческих целях. Для получения дополнительной информации, перейдите, пожалуйста, по ссылке (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian).

Все переводы предоставляются переводческим сообществом Translators without Borders (Переводчики без границ). Качество переводов тщательно проверяется, чтобы они были настолько точными, насколько это возможно, однако существует риск неточностей и искажения некоторой информации.

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

© 2024 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

Данная информация может быть использована в целях создания информационных материалов для пациентов. При цитировании необходимо ссылаться на данный оригинальный источник. Если вы хотите использовать часть материала для других публикаций, надлежащая ссылка на источник обязательна. При этом все логотипы, фирменные знаки, изображения и значки следует удалить. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.