

Splošni anestetiki:

Tveganja in neželeni učinki

Ljudje smo si različni in ni mogoče vedeti, kdo bo doživel neželeni učinek ali tveganje. Nekateri med njimi so bolj verjetni pri ljudeh, ki imajo obstoječe zdravstvene težave ali potrebujejo določene operacije.

Spodnje vrednosti so povprečja iz raziskovalnih študij. Ljudje v študijah so običajno imeli rutinsko operacijo, imeli so zdravo telesno težo in bili so brez posebnih zdravstvenih težav.

O raziskavah, ki smo jih uporabili, lahko več izveste tukaj:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Vaša tveganja so lahko višja ali nižja od teh vrednosti. Vaš anesteziolog se bo z vami pogovoril o tveganjih, za katera meni, da bi bila lahko za vas pomembna.

Več informacij o različnih vrstah anestezije lahko najdete na naši spletni strani, ki je na voljo v različnih jezikih na naslednjem naslovu: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Te vrednosti veljajo na 100 oseb.

Kaj se je zgodilo?	Kako dolgo?	Koliko? Na vsakih 100 oseb (sto oseb)
 Drgetanje	20–30 minut dolgo v sobi za okrevanje	 15 oseb je 85 oseb ni
 Slabost	1–24 ur dolgo	 Približno 15 oseb je Približno 85 oseb ni
 Boleče grlo	24–48 ur dolgo	 20–40 oseb je 60–80 oseb ni Odvisno od vrste uporabljene dihalne cevi
 Modrice ali bolečine od injekcij	Izginejo v nekaj dneh	 10 oseb je 90 oseb ni

	Manjše poškodbe ustnice ali jezika	Zacelijo se v nekaj dneh		1–5 oseb je	95–99 oseb ni
	Okužba v prsnem košu	Dneve ali tedne dolgo		20 oseb je	80 oseb ni
	Zmedenost (delirij)	Dneve, tedne ali mesece dolgo		10–50 oseb je	50–90 oseb ni

Naslednja tveganja so redka.

Te vrednosti veljajo na 10.000 oseb.

Kaj se je zgodilo?	Kako dolgo?	Koliko? Na vsakih 10.000 oseb (deset tisoč oseb)	
 Poškodbe zob	Osebo mora pregledati zobozdravnik	5 oseb je	9995 oseb ni
 Zamegljen vid, draženje oči ali bolečina zaradi majhne praske ali suhih oči	Nekaj dni	Približno 5 oseb je	Približno 9995 oseb ni
 Mravljinčenje, odrevenelost, bolečina ali šibkost (poškodba živcev)	Začasno (tedne do mesece dolgo)	1–5 oseb je	9995–9999 oseb ni
	Stalno	1 oseba je	9999 oseb ni
 Huda alergijska reakcija (anafilaksija)	Zgodi se hitro Takojšnje zdravljenje	1 oseba je	9999 oseb ni
 Srčni zastoj, npr. zaustavitev srca med operacijo	Takojšnje zdravljenje	3 osebe so	9997 oseb ni

Te vrednosti veljajo na 100.000 oseb.

Kaj se je zgodilo?	Koliko? Na vsakih 100.000 oseb (sto tisoč oseb)
 Oseba se je zbudila za kratek čas med splošno anestezijo (nenamerno osveščanje)	5 oseb se je 99.995 se ni 3–4 osebe na vsakih 100.000 so dejale, da je trajalo manj kot pet minut, pred operacijo ali po njenem zaključku. Približno 1 oseba na vsakih 100.000 je dejala, da je čutila bolečino.
 Oseba je izgubila vid (oslepela) zaradi pritiska ali krvnih strdkov, ki so prizadeli vidni živec.	1 oseba je 99.999 oseb ni
 Oseba je umrla zaradi zapletov operacije Oseba je umrla zaradi srčnega zastoja med operacijo ali takoj po njej Oseba je umrla zaradi anestetika To tveganje je zelo različno. Na primer, višje je pri določenih operacijah ali če so bile osebe šibke, starejše ali so imele določene zdravstvene težave.	14 oseb je 99.986 oseb ni 1 oseba je 99.999 oseb ni 1 oseba je 99.999 oseb ni

Omejitev odgovornosti

Trudimo se, da bi bili podatki v tej zloženki točni in aktualni, vendar tega ne zagotavljamo. Ne pričakujemo, da bodo te splošne informacije odgovorile na vsa vprašanja, ki bi jih lahko imeli, ali da bi obravnavale vsa področja, ki bi se vam zdela pomembna. O izbiri ali morebitnih težavah se posvetujte s svojim zdravniškim osebjem, pri tem pa naj vam ta navodila služijo kot vodilo. Samostojno te brošure ne smete obravnavati kot nasveta. Ne sme se uporabljati za komercialne ali poslovne namene. Za celotno izjavo o omejitvi odgovornosti kliknite tukaj (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/slovenian).

Vse prevode je zagotovila prevajalska skupnost Translators without Borders (Prevajalci brez meja). Kakovost teh prevodov je preverjena, kljub temu pa obstaja nevarnost netočnosti in napačne interpretacije nekaterih informacij.

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

© 2024 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

Ta brošura se lahko kopira za pripravo informacijskega gradiva za bolnike. Pri tem navedite ta izvirnik. Če želite del te brošure uporabiti v drugi publikaciji, morate to ustrezno navesti in odstraniti grafiko, blagovne znamke, slike in ikone. Za več informacij se obrnite na nas.