

# Anestesia general:

## Riesgos y efectos secundarios

Cada persona es diferente y no es posible prever quién experimentará un efecto secundario o un riesgo. Algunos son más probables en personas con problemas de salud o que necesitan determinadas cirugías.



Las cifras que figuran a continuación son promedios provenientes de estudios de investigación. Las personas que participaron en los estudios se sometieron generalmente a cirugía de rutina, tenían un peso saludable y no padecían enfermedades específicas.

Puede informarse sobre la investigación que utilizamos aquí:  
[www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence](http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence).

**Sus riesgos pueden ser superiores o inferiores a estas cifras. Su anestesista le hablará de los riesgos que considere más probables o importantes en su caso.**

Encontrará información sobre los distintos tipos de anestesia en nuestra página web, esta se encuentra disponible en varios idiomas: [www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages](http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages).

**Estas cifras corresponden a cada 100 personas.**

¿Qué ha pasado?	¿Durante cuánto tiempo?	¿Cuántas De cada 100 personas (cien personas)?
 <b>Escalofríos</b>	Durante 20-30 minutos en la sala de recuperación	 <b>15</b> presentaron escalofríos <b>85</b> no lo hicieron
 <b>Náuseas (sensación de malestar)</b>	Durante 1-24 horas	 <b>Alrededor de 15</b> padecieron náuseas <b>Alrededor de 85</b> no lo hicieron
 <b>Dolor de garganta</b>	Durante 24-48 horas	 <b>Entre 20-40</b> presentaron dolor <b>Entre 60-80</b> no lo hicieron Depende del tipo de tubo endotraqueal utilizado
 <b>Hematomas o dolor debido a las inyecciones.</b>	Desaparece en pocos días	 <b>10</b> lo experimentaron <b>90</b> no lo hicieron

	<b>Pequeña lesión en el labio o la lengua</b>	Se cura en pocos días		Entre <b>1-5</b> la presentaron	Entre <b>95-99</b> no lo hicieron
	<b>Infección respiratoria</b>	Durante días o semanas		<b>20</b> la padecieron	<b>80</b> no lo hicieron
	<b>Confusión (delirio)</b>	Durante días, semanas o meses		Entre <b>10-50</b> la experimentaron	Entre <b>50-90</b> no lo hicieron

**Los riesgos que se indican a continuación son poco frecuentes.**

Estas cifras corresponden a cada 10 000 personas.

<b>¿Qué ha pasado?</b>	<b>¿Durante cuánto tiempo?</b>	<b>¿Cuántas De cada 10 000 personas (diez mil personas)</b>
 <b>Daño en los dientes</b>	Requiere consulta con un dentista	<b>5</b> lo sufrieron <b>9995</b> no lo hicieron
 <b>Visión borrosa, irritación o dolor ocular</b> debido a un pequeño rasguño o a sequedad en los ojos.	Pocos días	<b>Cerca de 5</b> lo sufrieron <b>Alrededor de 9995</b> no lo hicieron
 <b>Hormigueo, adormecimiento, dolor o debilidad</b> (Daño neurológico).	Temporal (Semanas a meses) Permanente	Entre <b>1-5</b> la presentaron <b>1</b> lo sufrió <b>9999</b> no
 <b>Reacción alérgica grave (anafilaxia)</b>	Sucede rápidamente Tratada inmediatamente	<b>1</b> lo sufrió <b>9999</b> no
 <b>Paro cardíaco, por ejemplo, parada cardíaca durante una cirugía</b>	Tratada inmediatamente	<b>3</b> lo sufrieron <b>9997</b> no

Estas cifras corresponden a cada 100 000 personas.

¿Qué ha pasado?	¿Cuántas de cada 100 000 personas (cien mil personas)?	
 <p><b>Despertó por poco tiempo</b> durante el anestésico general (conciencia accidental)</p>	<p><b>5</b> lo hicieron</p> <p>3-4 cada 100 000 dijeron que duró menos de cinco minutos, antes o después de terminada la cirugía.</p> <p>Aproximadamente 1 de cada 100 000 manifestó haber sentido algún dolor.</p>	<p><b>99 995</b> no</p>
 <p><b>Perdió la visión (se quedó ciego)</b> debido a la presión o a coágulos sanguíneos que afectan al nervio óptico.</p>	<p><b>1</b> lo sufrió</p>	<p><b>99 999</b> no</p>
 <p><b>Falleció debido a complicaciones de la cirugía</b></p> <p><b>Murió debido a parada cardíaca durante o justo después de la cirugía</b></p> <p><b>Murió debido a la anestesia</b></p> <p>Este riesgo es muy variable. Por ejemplo, es más elevado en el caso de determinadas intervenciones quirúrgicas, o si las personas son frágiles, mayores o padecen determinados problemas de salud.</p>	<p><b>14</b> lo hicieron</p> <p><b>1</b> lo sufrió</p> <p><b>1</b> lo sufrió</p>	<p><b>99 986</b> no</p> <p><b>99 999</b> no</p> <p><b>99 999</b> no</p>

## Descargo de responsabilidad

Hacemos todo lo posible para mantener la información en este folleto precisa y actualizada, pero no podemos garantizarlo. No esperamos que esta información general cubra todas las preguntas que pueda tener o que aborde todo lo que pueda ser importante para usted. Debe analizar sus elecciones y cualquier preocupación que tenga con su equipo médico, utilizando este folleto como guía. Este folleto no pretende aconsejar. No se puede utilizar para ningún propósito comercial o de negocios. Para ver el descargo de responsabilidad completo, por favor haga clic aquí ([www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/spanish](http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/spanish)).

Todas las traducciones son proporcionadas por la comunidad de traductores de Translators Without Borders (Traductores Sin Fronteras). La calidad de estas traducciones se verifica para que sean lo más precisas posible, pero existe el riesgo de imprecisión y errores de interpretación de cierta información.

# www.rcoa.ac.uk

[patientinformation@rcoa.ac.uk](mailto:patientinformation@rcoa.ac.uk)

© 2024 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

Este folleto puede copiarse con el fin de producir material informativo para pacientes. Asegúrese de citar la fuente original. Si desea utilizar parte de este folleto en otra publicación, deberá citarlo debidamente y remover los logotipos, la marca, las imágenes y los íconos. Contáctenos para obtener más información.