

Pangkalahatang anestetiko:

Mga panganib at epekto

Lahat ay iba at hindi posibleng malaman kung sino ang makakaranas ng epekto o panganib. Ang ilan ay mas malamang sa mga taong may mga kasalukuyang kondisyon sa kalusugan o nangangailangan ng mga ilang operasyon.

Ang mga numerong nasa ibaba ay mga katamtaman mula sa mga pag-aaral sa pananaliksik. Ang mga tao sa mga pag-aaral ay karaniwang sumailalim sa rutin na operasyon, may malusog na timbang at walang tiyak na kondisyon sa kalusugan.

Maaari mong malaman tungkol sa pananaliksik na ginamit namin dito:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Ang iyong mga panganib ay maaaring mas mataas o mas mababa kaysa sa mga numerong ito. Ang iyong anestesista ay makikipag-usap sa iyo tungkol sa mga panganib na mas malamang, o mahalaga, para sa iyo.

Maaari kang makahanap ng impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng anestesiya sa aming website, na magagamit sa iba't ibang wika dito:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.


Ang mga numerong ito ay mula sa bawat 100 tao.

Anong nangyari?	Gaano katagal?	Ilan? Sa bawat 100 tao (isang daang tao)
 Panginginig	Sa loob ng 20–30 minuto sa silid ng paggaling	 15 gumawa 85 ang hindi
 Pagduduwal (pakiramdam ng sakit)	Para sa 1–24 oras	 Mga 15 ang gumawa Mga 85 ang hindi
 Masakiit na lalamunan	Para sa 24–48 oras	 20–40 gumawa 60–80 ang hindi Depende sa uri ng ginamit na tubo sa paghinga

	Mga pasa o pananakit mula sa mga bakuna.	Mawawala sa ilang araw		10 ang gumawa	90 ang hindi
	Maliit na pinsala sa labi o dila	Gagaling sa loob ng ilang araw		1–5 ang gumawa	95–99 ang hindi
	Impeksyon sa dibdib	Para sa mga araw o linggo		20 ang gumawa	80 ang hindi
	Nalilito (delirium)	Para sa mga araw, linggo o buwan		10–50 ang gumawa	50–90 ang hindi

Ang mga panganib sa ibaba ay bihira.

Ang mga bilang na ito ay mula sa bawat 10,000 katao.

Anong nangyari?	Gaano katagal?	Ilan? Sa bawat 10,000 tao (sampung libong tao)
 Sira sa ngipin	Kailangang magpatingin sa dentista	5 ang gumawa 9,995 ang hindi
 Malabong paningin, pangangati sa mata o pananakit dahil sa maliit na gasgas o tuyong mata.	Ilang araw	Mga 5 ang gumawa Mga 9,995 ang hindi
 Pangingilig, pamamanhid, pananakit o panghihina (pinsala sa ugat).	Pansamantala (mga linggo hanggang buwan) Permanente	1–5 ang gumawa 9,995–9,999 ang hindi 1 ang gumawa 9,999 ang hindi
 Malubhang reaksiyong alerhiya (anaphylaxis)	Mabilis mangyari Ginamot agad	1 ang gumawa 9,999 ang hindi
 Pag-atake sa puso, hal. paghinto ng puso sa panahon ng operasyon	Ginamot agad	3 ang gumawa 9,997 ang hindi

Ang mga numerong ito ay mula sa bawat 100,000 katao.

Anong nangyari?	Ilan? Sa bawat 100,000 katao (isang daang libong tao)
 Nagising saglit sa panahon ng pangkalahatang pampamanhid (aksidenteng kamalayan)	5 ang nangyari 99,995 ang hindi 3–4 sa bawat 100,000 ang nagsabi na tumagal ito ng wala pang limang minuto, bago ang operasyon o pagkatapos nito. Humigit-kumulang sa 1 sa bawat 100,000 ang nagsabing nakaramdam sila ng kirot.
 Nawala ang kanilang paningin (nabulag) dahil sa presyon o mga pamumuo ng dugo na nakakaapekto sa optic nerve.	1 ang gumawa 99,999 ang hindi
 Namatay dahil sa komplikasyon ng operasyon Namatay dahil sa pag-atake sa puso habang o pagkatapos lang ng operasyon Namatay dahil sa anestetiko Malaki ang pagkakaiba ng panganib na ito. Halimbawa, ito ay mas mataas para sa ilang partikular na operasyon, o kung ang mga tao ay mahina, mas matanda o may ilang partikular na kondisyon sa kalusugan.	14 ang nangyari 99,986 ang hindi 1 ang gumawa 99,999 ang hindi 1 ang gumawa 99,999 ang hindi

Disclaimer

Sinisikap naming mapanatiling tama at napapanahon ang impormasyon sa polyetong ito, ngunit hindi namin ito magagarantiya. Hindi namin inaasahan na masasakop ng pangkalahatang impormasyon na ito ang lahat ng mga katanungan na maaaring mayroon ka o na matugunan nito ang lahat ng maaaring mahalaga para sa iyo. Dapat ninyong pag-usapan ng iyong mga doktor ang mga desisyon at anumang alalahanin na mayroon ka, gamit ang polyetong ito bilang gabay. Ang leaflet na ito kung mag-isa ay hindi dapat ituring na payo. Hindi ito maaaring gamitin para sa anumang layuning pangkomersiyo o pangnegosyo. Para mabasa ang buong paunawa, pakitingnan ang: (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog).

Gawa ang lahat ng pagsasalin ng komunidad ng mga tagasalin ng Translators Without Borders. Sinusuri ang kalidad ng mga pagsasalang ito para masigurong hangga't maaari ay tama ang mga salin, ngunit maaaring magkaroon ng mga hindi tamang salin at maling pagpapakahulugan sa ilang impormasyon.

www.rcoa.ac.uk
patientinformation@rcoa.ac.uk

© 2024 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

Maaaring kopyahin ang polyeto na ito para sa layunin ng paggawa ng materyal ng impormasyon para sa pasyente. Mangyaring sipiin ang orihinal na akdang ito. Kung may bahagi ng polyeto na nais mong gamitin sa ibang publikasyon, dapat na magbigay ng angkop na pagkilala at alisin ang mga logo, branding, larawan at icon. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.