

Genel anestezi:

Riskler ve yan etkiler

Herkes farklıdır ve kimin bir yan etki veya risk yaşayacağını bilmek mümkün değildir. Bazı yan etkilerin mevcut sağlık sorunları olan veya belirli ameliyatlara ihtiyaç duyan kişilerde görülmesi daha olasıdır.

Aşağıdaki sayılar, araştırmalardan elde edilen ortalamalardır. Çalışmalara katılan kişiler genellikle rutin ameliyatlara geçirmiş, sağlıklı kiloda ve özel sağlık sorunları olmayan kişilerdir.

Kullandığımız araştırma hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Riskleriniz bu sayılardan daha yüksek veya daha düşük olabilir. Anestezi uzmanınız, sizin için daha olası veya önemli olan riskleri size açıklayacaktır.

Farklı anestezi türleri hakkındaki bilgilere farklı dillerde mevcut olan internet sitemizden ulaşabilirsiniz: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Bu sayılar her 100 kişi içindir.

Ne oldu?	Ne kadar süre için?	Kaç kişide? Her 100 kişiden (yüz kişi)
 Titreme	Ayılma odasında 20-30 dakika boyunca	 15 kişi deneyimledi 85 kişi deneyimlemedi
 Mide bulantısı (hasta hissetme)	1-24 saat boyunca	 Yaklaşık 15 kişi deneyimledi Yaklaşık 85 kişi deneyimlemedi
 Boğaz ağrısı	24-48 saat boyunca	 20-40 kişi deneyimledi 60-80 kişi deneyimlemedi Kullanılan solunum tüpünün türüne bağlıdır
 Morarma veya ağrı enjeksiyon kaynaklı.	Birkaç gün içerisinde geçer	 10 kişi deneyimledi 90 kişi deneyimlemedi

	Hafif dudak veya dil yaralanması	Birkaç gün içerisinde iyileşir		1-5 kişi deneyimledi	95-99 kişi deneyimlemedi
	Alt solunum yolları enfeksiyonu	Günlerce veya haftalarca		20 kişi deneyimledi	80 kişi deneyimlemedi
	Bilinç bulanıklığı (deliryum)	Günlerce, haftalarca ya da aylarca		10-50 kişi deneyimledi	50-90 kişi deneyimlemedi

Aşağıda belirtilen riskler nadirdir.

Bu sayılar her 10.000 kişi için verilmiştir.

Ne oldu?	Ne kadar süre için?	Kaç kişide? Her 10.000 kişiden (on bin kişi)	
	Dişlerde hasar	Bir diş hekimi tarafından görülmesi gerekir	5 kişi deneyimledi 9.995 kişi deneyimlemedi
	Bulanık görme, göz tahrişi veya ağrısı küçük bir çizikten veya kuru gözlerden dolayı	içerisinde geçer	Yaklaşık 5 kişi deneyimledi Yaklaşık 9.995 kişi deneyimlemedi
	Karıncaalanma, uyuşukluk, ağrı veya güçsüzlük (sinir hasarı)	Geçici (haftalar ila aylar) Daimi	1-5 kişi deneyimledi 9.995-9.999 kişi deneyimlemedi 1 kişi deneyimledi 9.999 kişi deneyimlemedi
	Şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi)	Çabuk gerçekleşir Hemen tedavi edilir	1 kişi deneyimledi 9.999 kişi deneyimlemedi
	Kardiyak arrest, yani ameliyat sırasında kalbin durması	Hemen tedavi edilir	3 kişi deneyimledi 9.997 kişi deneyimlemedi

Bu sayılar her 100.000 kişi için verilmiştir.

Ne oldu?	Kaç kişide? Her 100.000 kişiden (yüz bin kişi)
 Kısa bir süreliğine uyandı genel anestezi sırasında (kazara farkındalık)	5 kişi deneyimledi 99.995 kişi deneyimlemedi Her 100.000 kişiden 3-4'ü bunun ameliyattan önce veya ameliyat bittikten sonra beş dakikadan az sürdüğünü söylemiştir. Her 100.000 kişiden yaklaşık 1'i biraz acı hissettiğini söylemiştir.
 Görme yeteneklerini kaybettiler (kör oldular) Optik siniri etkileyen basınç veya kan pıhtıları nedeniyle.	1 kişi deneyimledi 99.999 kişi deneyimlemedi.
 Ameliyat komplikasyonları nedeniyle öldü Ameliyat sırasında veya hemen sonrasında kalp durması nedeniyle öldü Anestezi nedeniyle öldü Bu risk büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Örneğin, belirli ameliyatlarda özelinde veya kişilerin zayıf, yaşlı veya belirli sağlık koşullarına sahip olması durumunda daha yüksektir.	14 kişi deneyimledi 99.986 kişi deneyimlemedi 1 kişi deneyimledi 99.999 kişi deneyimlemedi. 1 kişi deneyimledi 99.999 kişi deneyimlemedi.

Yasal uyarılar

Bu broşürdeki bilgileri doğru ve güncel tutmak için çok çalışsak da bilgilerin her zaman doğru ve güncel olduklarını garanti etmemiz mümkün değildir. Buradaki genel bilgilerin, sorabileceğiniz tüm soruları kapsamaması veya sizin için önemli olabilecek her şeye yer vermesini beklemiyoruz. Bu broşürü bir kılavuz olarak kullanarak tercihlerinizi ve endişelerinizi tıbbi ekibinizle görüşmelisiniz. Bu broşüre kendi başına, tavsiye gözüyle bakılmaması gerekir. Herhangi bir ticari amaç ya da iş amacı ile kullanılamaz. Yasal uyarının tamamı için buraya tıklayın (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish).

Çevirilerin tamamı Translators Without Borders çevirmenleri tarafından sağlanmaktadır. Çevirilerin olabildiğince hatasız olması için kalite kontrol işlemi yapılmaktadır fakat bazı bilgilerin hatalı olması ve yanlış yorumlanması riski mevcuttur.

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

© 2024 Royal College of Anaesthetists (RCOA)

Bu bilgiler hasta bilgi materyali oluşturmak amacıyla kopyalanabilir. Lütfen orijinal kaynağın bu olduğunu belirtin. Bu bilgilerin bir kısmını başka bir yayında kullanmak isterseniz uygun atıfta bulunmalı ve grafikleri, markaları, resimleri ve simgeleri çıkarmalısınız. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.