

Bendroji anestezija

Rizika ir šalutiniai poveikiai

Kiekvienas žmogus yra skirtingas ir neįmanoma žinoti, kam pasireiškės šalutinis poveikis ar kils rizika. Kai kurie iš jų dažniau pasireiškia žmonėms, turintiems sveikatos sutrikimų arba kuriems reikalingos tam tikros operacijos.


Toliau pateikti skaičiai yra tyrimų vidurkiai. Tyrimuose dalyvavę žmonės dažniausiai buvo operuoti įprastai, buvo sveiko svorio ir neturėjo specifinių sveikatos sutrikimų.

Apie mūsų panaudotą tyrimą galite sužinoti: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Jūsų rizika gali būti didesnė arba mažesnė nei šie skaičiai. Anesteziologas aptars su Jumis riziką, kuri Jums yra labiau tikėtina arba reikšminga.

Informaciją apie įvairias anestezijos rūšis galite rasti mūsų interneto svetainėje įvairiomis kalbomis: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Šie poveikiai pasireiškė imant 100 žmonių.

Kas nutiko?	Kiek truko?	Kiek? Iš 100 žmonių (šimto žmonių)
 Drebulys	20–30 minučių pooperacinėje palatoje	 15 patyrė 85 nepatyrė
 Pykinimas (bloga savijauta)	1–24 val.	 Apie 15 patyrė Apie 85 nepatyrė
 Gerklės skausmas	24–48 valandas	 20–40 patyrė 60–80 nepatyrė Priklauso nuo naudojamo kvėpavimo vamzdelio tipo.
 Mėlynės arba skausmas po injekcijų	Praeina per kelias dienas	 10 patyrė 90 nepatyrė

	Nedideli lūpos ar liežuvio sužeidimai	Sugyja per kelias dienas	
	Krūtinės ląstos infekcija	Kelias dienas ar savaites	
	Sutrikusi orientacija (klaidėjimas)	Kelias dienas, savaites ar mėnesius	

Toliau išvardyta rizika yra reta.
Ji pasireiškė imant 10 000 žmonių.

Kas nutiko?	Kiek truko?	Kiek? Iš 10 000 žmonių (dešimt tūkstančių žmonių)
 Dantų pažeidimai	Reikia, kad apžiūrėtų odontologas	5 patyrė 9 995 nepatyrė
 Neryškus regėjimas, sudirgę akys ar akių skausmas dėl nedidelio įbrėžimo ar akių sausumo	Kelios dienos	Apie 5 patyrė Apie 9 995 nepatyrė
 Dilgčiojimas, tirpimas, skausmas ar silpnumas (nervų pažeidimas)	Laikinas (savaitėmis ar mėnesiais) Nuolatinis	1–5 patyrė 9 995 – 9 999 nepatyrė 1 patyrė 9 999 nepatyrė
 Sunki alerginė reakcija (anafilaksija)	Įvyksta greitai Gydoma nedelsiant	1 patyrė 9 999 nepatyrė
 Širdies sustojimas, pvz., širdies sustojimas operacijos metu	Gydoma nedelsiant	3 patyrė 9 997 nepatyrė

Šie poveikiai pasireiškė imant 100 000 žmonių.

Kas nutiko?	Kiek? Iš 100 000 žmonių (šimto tūkstančių žmonių)
 Trumpam pabudo bendrosios anestezijos metu (netyčia atgavo sąmonę)	5 patyrė 99 995 nepatyrė 3–4 iš 100 000 respondentų teigė, kad tai truko mažiau nei penkias minutes prieš operaciją ar po jos pabaigos. Maždaug 1 iš 100 000 teigė, kad jautė tam tikrą skausmą.
 Prarado regėjimą (apako) dėl spaudimo ar kraujo krešulių, veikiančių regos nervą	1 patyrė 99 999 nepatyrė
 Mirė dėl operacijos komplikacijų Mirė dėl širdies sustojimo operacijos metu arba iškart po jos Mirė dėl anestezijos Ši rizika labai skiriasi. Pavyzdžiui, ji yra didesnė atliekant tam tikras operacijas arba jei žmonės buvo nusilpę, vyresnio amžiaus ar turėjo tam tikrų sveikatos sutrikimų.	14 mirusių 99 986 nepatyrė 1 patyrė 99 999 nepatyrė 1 patyrė 99 999 nepatyrė

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Labai stengiamės, kad informacija šiame leidinyje būtų tiksli ir nuolat atnaujinama, tačiau negalime to garantuoti. Nemanome, kad ši bendro pobūdžio informacija gali atsakyti į visus Jums iškylančius klausimus ar apimti visus dalykus, kurie gali būti Jums svarbūs. Turėtumėte aptarti savo pasirinkimą ir visus rūpimus klausimus su savo gydytojų komanda, naudodamiesi šia informacija kaip gairėmis. Šis leidinys neturėtų būti traktuojamas kaip rekomendacija. Jis negali būti naudojamas jokiems komerciniams ar verslo tikslams. Visą atsakomybės ribojimo pareiškimo tekstą rasite:

(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/lithuanian).

Visus vertimus pateikė „Translators Without Borders“ vertėjų bendruomenė. Šių vertimų kokybė yra tikrinama, kad vertimai būtų kiek įmanoma tikslesni, tačiau visuomet galima tam tikros informacijos netikslumų ir netinkamos jos interpretacijos rizika.

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

© 2024 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

Ši informacija gali būti kopijuojama pacientams skirtos informacinės medžiagos rengimo tikslais. Prašome nurodyti šį pirminį informacijos šaltinį. Jei norite dalį šios informacijos panaudoti kitame leidinyje, turite tinkamai paminėti šį šaltinį ir pašalinti grafinius elementus, prekių ženklus, paveikslėlius ir piktogramas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.