

بيھوشي عمومي:

خطرات و عوارض جانبي

همه افراد متفاوت هستند و از قبل نمی‌توان متوجه شد که چه کسی یک عارضه جانبی یا یک خطر را تجربه خواهد کرد. رخ دادن عوارض جانبی برای افرادی که درگیر مشکلات سلامتی هستند و یا نیاز به عمل‌های جراحی خاصی دارند، بیشتر است.

اعداد زیر به طور میانگین از مطالعات تحقیقاتی انجام شده به دست آمده اند. افرادی که در این تحقیقات مطالعه شدند به طور کلی یک جراحی عادی داشته، وزن مناسبی داشتند و مریضی خاصی نداشتند.

می‌توانید درباره نتایج تحقیقاتی که ما استفاده کردیم در اینجا اطلاعات کسب کنید:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence

ریسک ابتلای شما ممکن است بیشتر یا کمتر از این اعداد باشد. متخصص بیهوشی با شما درباره خطرهایی که برای شما محتمل تر و یا حائز اهمیت بیشتری هستند، گفتگو خواهد کرد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره آماده سازی خود برای عمل جراحی به وبسایت ما که به زبان های مختلف است، مراجعه

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages: کنید

این اعداد از هر ۱۰۰ نفر است.


چند تا؟ از هر ۱۰۰ نفر (صد نفر)		برای چگونه مدت؟	چه اتفاقی افتاد؟

 ۹۵ تا ۹۹ نفر نداشتند ۱ تا ۵ نفر داشتند	ظرف چند روز بهبود می یابد	جراحت جزئی لب یا زبان	
 ۸۰ نفر نداشتند ۲۰ نفر داشتند	برای روزها یا هفته ها	عفونت قفسه سینه	
 ۵۰ تا ۹۰ نفر نداشتند ۱۰ تا ۵۰ نفر داشتند	برای روزها، هفته ها و یا ماه ها	گیج شدن (هذیان)	

خطرات زیر نادر هستند.
این اعداد از هر ۱۰۰۰۰ نفر است.

چه اتفاقی افتاد؟	برای چگونه مدت؟	چند تا؟ از هر ۱۰۰۰۰ نفر (ده هزار نفر)
آسیب به دندان	باید توسط دندانپزشک ویزیت شود	۵ نفر داشتند ۹۹۹۵ نفر نداشتند
تاری دید، سوزش چشم یا درد چشم به دلیل خراش کوچک یا خشکی چشم	چند روز	حدود ۵ نفر داشتن حدود ۹۹۹۵ نفر نداشتند
گزگز، بی حسی، درد یا ضعف (آسیب عصبی).	موقت (چند هفته تا چند ماه) دائمی	۱ تا ۵ نفر داشتند ۹۹۹۵ تا ۹۹۹۹ نفر نداشتند ۱ نفر داشت ۹۹۹۹ نفر نداشتند
واکنش آلرژیک شدید (آنافیلاکسی)	به سرعت اتفاق می افتد بلافاصله درمان شد	۱ نفر داشت ۹۹۹۹ نفر نداشتند
ایست قلبی، به عنوان مثال ایست قلب در حین جراحی	بلافاصله درمان شد	۳ نفر داشتند ۹۹۹۷ نفر نداشتند

چند تا؟ از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر (صد هزار نفر)		چه اتفاقی افتاد؟
۵ نفر داشتند	۹۹۹۹۵ نفر نداشتند	برای مدت کوتاهی بیدار شدند در حین بی‌هوشی عمومی (هوشیاری تصادفی)
۱ نفر داشت	۹۹۹۹۹ نفر نداشتند	بینایی خود را از دست دادند (کور شدند) به دلیل فشار به عصب بینایی یا لخته شدن خون در عصب بینایی.
۱۴ نفر داشتند	۹۹۹۸۶ نفر نداشتند	بر اثر عوارض جراحی فوت کرد
۱ نفر داشت	۹۹۹۹۹ نفر نداشتند	به دلیل ایست قلبی در حین یا بلافاصله پس از عمل جراحی فوت کرد
۱ نفر داشت	۹۹۹۹۹ نفر نداشتند	بر اثر بیهوشی فوت کرد



سلب مسئولیت

ما همه تلاشمان را می‌کنیم تا اطلاعات ارائه شده در این جزوه درست و به روز باشند، اما نمی‌توانیم تضمینی در این باره بدهیم. ما انتظار نداریم که این اطلاعات کلی تمام سوالات احتمالی شما را پوشش دهند یا به همه مسائلی که برای شما مهم باشند، رسیدگی کنند. شما می‌بایست در مورد تصمیم‌ها یا نگرانی‌هایتان با تیم پزشکی خود مشورت کنید و این جزوه را فقط نوعی راهنما در نظر بگیرید. این بروشور نمی‌تواند جایگزین توصیه‌های تیم پزشکی شود. استفاده از این جزوه برای مصارف تبلیغاتی یا تجاری ممنوع است. برای دسترسی به متن کامل سلب مسئولیت لطفاً به لینک مقابل مراجعه نمایید:

www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

همه ترجمه‌ها توسط سازمان Translators without Borders (مترجمان بدون مرز) انجام شده‌اند. کیفیت این ترجمه‌ها، به منظور اطمینان از صحیح بودن آنها بررسی شده‌اند، هر چند که همیشه احتمال ترجمه یا برداشت اشتباه از بعضی اطلاعات وجود دارد.

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

Royal College of Anaesthetists 2024 ©

این اطلاعات می‌تواند به منظور تولید مطالب اطلاعاتی برای بیمار باز نشر گردد. لطفاً این منبع اصلی را ذکر کنید. اگر مایل به استفاده از بخشی از این جزوه در نشریه دیگری هستید، باید تصدیق مناسب انجام شود و لوگوها، نام تجاری، تصاویر و نمادها حذف شوند. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.