

Anestezice:
riscuri și efecte secundare

Durere în gât

Despre această broșură

Acest broșură este despre **durerile în gât care apar după o anestezie generală**. Acestea sunt un efect secundar pe care l-ați putea resimți după ce vi se administrează un anestezic general. Broșura explică cauzele acestora și ce se poate face în privința lor.

Anestezicele generale sunt medicamente care produc o stare de somn profund. Sunt esențiale pentru anumite operații și proceduri. În timpul unei anestezii generale, sunteți inconștient(ă) și nu simțiți nimic.

Puteți citi mai multe detalii despre diferitele tipuri de anestezice pe site-ul nostru, care este disponibil în mai multe limbi aici:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.


Cum se manifestă?

- Este posibil să simțiți un disconfort sau dureri mai puternice în gât.
- Durerea în gât durează, de obicei, 24-48 ore.
- Este posibil să aveți vocea răgușită.
- Este posibil să vă simțiți gâtul foarte uscat.

Care este probabilitatea să se manifeste?

Probabilitatea apariției durerilor în gât depinde de echipamentul pe care îl folosește medicul anestezișt.

Din 100 de persoane



20-40 au fost afectate

60-80 nu au fost afectate

Aceste cifre provin din studii de cercetare. Pe site-ul nostru puteți vedea de unde am obținut datele: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Ce cauzează dureri în gât după anestezie?

Unele gaze și medicamente anestezice vă pot usca gâtul.

Unele dintre echipamentele pe care medicii anesteziști le folosesc în timpul unei anestezii generale vă pot irita gâtul.

În timpul unei anestezii generale, mușchii din corp se relaxează, în special cei din jurul gâtului și al pieptului. Acest lucru poate reduce cantitatea de aer care intră în plămâni.

Pentru a asigura un flux continuu de oxigen către plămâni, anestezistul vă poate introduce un tub de respirație în gât, pentru a vă menține căile respiratorii deschise. De obicei, anesteziștii fac acest lucru după ce sunteți inconștient(ă).

Tuburile sau măștile pe care anestezistul le folosește în timp ce sunteți inconștient(ă) vă pot provoca dureri în gât deoarece:

- vă pot irita gâtul atunci când sunt introduse sau îndepărtate
- unele sunt gonflabile și pot apăsa pe gât atunci când se umflă. Acest lucru poate provoca disconfort.

Puteți afla mai multe informații privind căile respiratorii și respirația în timpul anesteziei pe site-ul nostru, care este disponibil în mai multe limbi aici:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Ce vă poate fi de folos?

Puteți lua analgezice, cum ar fi ibuprofenul sau paracetamolul. Consultați medicul de familie sau farmacistul pentru a afla care este cel mai bun analgezic pentru dumneavoastră. De asemenea, vi se pot administra medicamente pentru durere la spital, înainte de a pleca acasă.

Când să cereți ajutor

- Dacă durerea se agravează și aveți probleme la înghițire la o săptămână după anestezie, trebuie să consultați medicul de familie sau asistenta medicală sau să solicitați sfatul unui farmacist.
- Dacă aveți dificultăți de respirație sau tuse cu sânge, trebuie să contactați urgent medicul de familie sau anestezistul pentru sfaturi suplimentare.

Declinarea responsabilității

Ne străduim din răspuțeri să menținem informațiile din această broșură exacte și actualizate, dar nu putem garanta acest lucru. Nu ne așteptăm ca aceste informații generale să acopere toate întrebările pe care le-ați putea avea sau să abordeze toate aspectele care ar putea fi importante pentru dumneavoastră. Ar trebui să discutați cu echipa medicală despre opțiunile dumneavoastră și despre orice îngrijorare pe care o aveți, folosind această broșură ca ghid. Această broșură în sine nu trebuie considerată drept îndrumar. Nu poate fi utilizată în scopuri comerciale sau de afaceri. Pentru precizări legale complete, vă rugăm să faceți clic aici:

www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian.

Toate traducerile sunt furnizate de comunitatea de traducători a organizației Translators without Borders (Traducători fără frontiere). Calitatea acestor traduceri este verificată pentru ca traducerile să fie cât mai exacte posibil, însă există riscul unor inexactități și al interpretării eronate a anumitor informații.

Spuneți-ne părerea dumneavoastră

Așteptăm sugestiile dumneavoastră pentru a îmbunătăți această broșură.

Dacă aveți observații cu privire la această broșură vă rugăm să le trimiteți la adresa de e-mail: patientinformation@rcoa.ac.uk

Royal College of Anaesthetists

Churchill House, 35 Red Lion Square, Londra WC1R 4SG

www.rcoa.ac.uk

Ediția a șasea, noiembrie 2024

Această broșură va fi revizuită în termen de trei ani de la data publicării.

© 2024 Royal College of Anaesthetists

Această broșură poate fi copiată în scopul producerii de materiale informative pentru pacienți. Vă rugăm să citați sursa originală. Dacă doriți să utilizați o parte din broșură într-o altă publicație, trebuie să specificați sursa în mod adecvat și să eliminați siglele, mărcile, imaginile și pictogramele. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.