

Anesthésiques : risques et effets secondaires

Dommages aux dents, aux lèvres et à la langue

À propos de cette brochure

Cette brochure concerne les **dommages des dents, aux lèvres et à la langue** qui peuvent survenir lorsque vous êtes mis sous anesthésie générale. Elle explique de quelle façon ces dommages peuvent se produire et ce qui peut être fait pour y remédier.

Les anesthésiques généraux sont des médicaments qui provoquent une sorte de sommeil profond. Ils sont essentiels pour certaines interventions chirurgicales et procédures. Pendant une anesthésie générale, le patient est inconscient et ne ressent rien.

De plus amples informations sur les différents types d'anesthésiques sont disponibles en plusieurs langues sur notre site internet à cette adresse :

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Dommages causés aux dents, aux lèvres et à la langue lors d'une anesthésie

La bouche et les lèvres peuvent parfois présenter de petites coupures ou des ecchymoses après une anesthésie. Elles guérissent généralement en quelques jours.

Les dents peuvent être ébréchées, se déchausser ou parfois sortir par accident au cours d'une anesthésie générale.

Pendant une anesthésie générale, les muscles de votre corps se relâchent, y compris ceux autour de votre gorge et de votre poitrine. Cela peut réduire la quantité d'air qui pénètre dans vos poumons.

Pour assurer un flux continu d'oxygène vers vos poumons, l'anesthésiste peut placer un tube endotrachéal dans votre gorge pour maintenir vos voies respiratoires ouvertes. Cette intervention est généralement effectuée une fois que vous êtes inconscient.


Les tubes ou les masques que votre anesthésiste utilise pendant que vous êtes inconscient peuvent accidentellement endommager vos dents, vos lèvres et votre langue. Cet équipement est nécessaire pour assurer votre sécurité pendant l'anesthésie.

Pour plus d'informations sur vos voies respiratoires et votre respiration pendant l'anesthésie, consultez notre site Web, disponible en plusieurs langues à l'adresse suivante : www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Quelle est la probabilité que cela se produise ?

Coupures ou ecchymoses mineures sur les lèvres et la langue

Sur 100 personnes




1 à 5 concernées

95 à 99 non concernées

Dommmages aux dents nécessitant l'intervention d'un dentiste

Sur 10 000 personnes



Plus de la moitié des personnes ayant subi des dommages dentaires avaient des dents et des gencives qui étaient en mauvais état avant l'intervention chirurgicale.

Ces chiffres proviennent de travaux de recherche. Pour connaître la source de nos chiffres, veuillez consulter notre site web : www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Qu'est-ce qui pourrait renforcer cette probabilité ?

Les dommages sont plus probables si :

- vous ne pouvez pas ouvrir la bouche très largement ou vous ne pouvez pas bouger le cou facilement. Par exemple, certaines affections arthritiques peuvent rendre difficile le mouvement du cou ou la position de la tête lors d'une anesthésie générale
- vous avez des dents supérieures très proéminentes ou une mâchoire inférieure plus petite
- vous avez besoin d'une anesthésie générale dans une situation d'urgence
- vous avez besoin d'une césarienne d'urgence sous anesthésie générale
- vous souffrez d'obésité ou portez un embonpoint autour du cou
- vous subissez une opération de la bouche, du cou, de la mâchoire ou de l'œsophage.

Que faire pour l'éviter ?

Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même pour réduire le risque de dommages à vos dents avant l'opération.

Si vos dents se déchaussent, si vos gencives sont douloureuses ou si elles saignent lorsque vous les brossez, vous devriez consulter votre dentiste dès que vous savez que vous avez besoin d'une intervention chirurgicale.

Informez votre anesthésiste si :

- vous avez des dents déchaussées ou tout autre problème au niveau des dents et des gencives
- vous avez une orthèse amovible ou des bandes élastiques
- si vous avez des implants, des couronnes, des bridges, des facettes ou des fausses dents
- vous avez des piercings sur la langue ou les lèvres.

Vous devez informer votre anesthésiste si vous avez déjà subi une anesthésie générale dans le passé et :

- on vous a dit qu'il était difficile de mettre un tube dans vos voies respiratoires
- vous avez subi des dommages aux dents.

Parfois, votre anesthésiste peut vérifier votre dossier médical pour comprendre ce qui a causé les difficultés et éviter de causer à nouveau des dommages.

Que faire si mes dents sont abîmées ?

Votre anesthésiste vous dira si vos dents ont été endommagées pendant l'opération. Si des dents sont sorties, elles vous seront rendues. Ils vous donneront un soulagement de la douleur si vous en avez besoin et vous conseilleront sur les mesures à prendre.

Certains hôpitaux disposent de chirurgiens-dentistes qui peuvent examiner les dégâts et les réparer. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter votre propre dentiste et demander le remboursement des frais à l'hôpital. Vous devez vous renseigner auprès de votre hôpital sur sa politique en matière de dommages dentaires survenus au cours d'une intervention chirurgicale et demander un formulaire de demande de remboursement.

Si l'anesthésiste a eu du mal à introduire un tube dans votre gorge ou si vos dents ont été endommagées, demandez un compte rendu écrit de ce qui s'est passé. Cette information pourrait vous sauver la vie si vous deviez subir une autre anesthésie à l'avenir.

La Difficult Airway Society gère un système de carte d'alerte pour les voies respiratoires. Votre anesthésiste peut vous orienter vers ce programme. Vous trouverez plus d'informations sur ce lien : <https://das.uk.com/dar>.

Décharge de responsabilité

Nous nous efforçons de maintenir l'exactitude et la mise à jour des informations contenues dans cette brochure, mais nous ne pouvons le garantir. Veuillez noter que ces informations générales ne peuvent pas répondre à toutes vos questions ni couvrir tous les sujets qui pourraient vous intéresser. Nous vous invitons donc à discuter de vos choix et de vos préoccupations avec votre équipe médicale, en vous aidant de cette brochure. Cette brochure ne doit pas être considérée comme un avis. Elle ne peut être utilisée à des fins commerciales. Pour consulter l'intégralité de la clause de décharge de responsabilité, veuillez consulter : [www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french].

Toutes les traductions sont effectuées par la communauté de traducteurs de Traducteurs Sans Frontières. La qualité de ces traductions est vérifiée afin de les rendre aussi précises que possible, mais des inexactitudes ou des erreurs d'interprétation sont possibles pour certaines informations.

Votre avis nous intéresse

Toutes les idées pour améliorer cette brochure sont les bienvenues.

Si vous avez des commentaires dont vous souhaitez nous faire part, merci de les faire parvenir à cette adresse : patientinformation@rcoa.ac.uk

Royal College of Anaesthetists

Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG

www.rcoa.ac.uk

Sixième édition, novembre 2024

Cette brochure sera révisée dans les trois ans suivant sa date de publication.

© 2024 Royal College of Anaesthetists

Cette brochure peut être copiée dans le but de produire du matériel d'information pour les patients. Veuillez citer cette source originale. Si vous souhaitez utiliser une partie de cette brochure dans une autre publication, une mention appropriée doit être fournie et les logos, marques, images et icônes doivent être supprimés. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.