

麻醉中的常见事件和风险

这张汇总卡显示了正常体重的健康成年患者在进行常规手术全身麻醉时面临的常见事件和风险（专科手术可能有不同的风险）。

现代麻醉剂非常安全。麻醉药物或所使用设备会带来一些常见的副作用，它们通常不严重也不会持续很久。风险因人而异，并取决于所使用的程序和麻醉技术。您的麻醉师将与您讨论他们认为对您来讲哪些风险更为显著。您也应该与他们讨论任何您觉得重要的事。

您的麻醉师可能不会对一些不常见的风险与您作例行讨论，除非他们认为您的风险较高。这些风险没有显示在本卡片上。



很常见的——超过 1/10，
相当于您家人当中有一人



不适



颤抖



口渴*



喉咙痛



淤青



暂时失去记忆（主要是60岁以上的人士）



常见的——在 1/10 到 1/100
之间，相当于一条街上有一人



注射部位疼痛*



嘴唇或舌头受轻伤



不常见的——在 1/100 到 1/1000
之间，相当于一个村子里有一人



轻度神经损伤



罕见的——在 1/1000 到 1/10000
之间，相当于一个小镇里有一人



1000人里有一人
有永久性的外周神经损伤



2800人里有一人
角膜擦伤（眼睛刮伤）



4500人里有一人
牙齿损伤需要治疗



10000人里有一人
有过敏反应（对药物
有严重的过敏反应）



非常罕见的——在 1/10000 到 1/100000 之间 或更少
，相当于一个大城镇里有一人



我们日常生活中都有的风险，比如在路上行驶，实际上比以下风险 大得多。



20000人里有一人
在麻醉过程中有意识



100000人里有一人
失明



100000人里有一人
直接由于麻醉死亡

*第一次短程全国麻醉项目 (SNAP-1) 研究。Br J Anaesth 2016 (<https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>).