

Anesthetig cyffredinol:

Risgiau a sgil-ffeithiau

Mae pawb yn wahanol ac nid yw'n bosibl gwybod pwy fydd yn profi sgil-ffaith neu risg. Mae rhai o'r rhain yn fwy tebygol ymysg pobl sydd â chyflyrau iechyd presennol neu sydd angen llawdriniaethau penodol.









Mae'r rhifau isod yn dangos canlyniadau cyfartalog o astudiaethau ymchwil. Roedd y bobl yn yr astudiaethau fel arfer yn cael llawdriniaeth arferol, roedd eu pwysau'n iach ac nid oedd ganddynt gyflyrau iechyd penodol.







Mae gwybodaeth am yr ymchwil a ddefnyddiwyd gennym ar gael yma:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Gall eich risgiau chi fod yn uwch neu'n is na'r rhifau hyn. Bydd eich anesthetydd yn trafod â chi'r risgiau sydd yn fwy tebygol, neu'n fwy arwyddocaol i chi.

Mae rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o anesthesia ar gael mewn ieithoedd gwahanol ar ein gwefan: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.






Mae'r rhifau hyn yn dangos nifer y bobl fesul 100.

Beth ddigwyddodd?	Am ba hyd?	Faint? O bob 100 o bobl (cant o bobl)
 Crynu	Am 20–30 munud yn yr ystafell wella	 15 wedi profi hyn 85 heb brofi hyn
 Cyflog (teimlo'n gyfogyld)	Am 1–24 awr	 Tua 15 wedi profi hyn Tua 85 heb brofi hyn
 Dolur gwddf/Gwddf tost	Am 24–48 awr	 20–40 wedi profi hyn 60–80 heb brofi hyn Yn dibynnu ar y math o diwb anadlu a ddefnyddiwyd
 Cleisio neu boen yn sgil pigiadau.	Yn diflannu mewn ychydig ddyddiau	 10 wedi profi hyn 90 heb brofi hyn


	Mân anaf i'r wefus neu'r tafod	Yn gwella mewn ychydig ddyddiau	
	Haint ar y frest	Am ddyddiau neu wythnosau	
	Dod yn ddrislyd (deliriwm)	Am ddyddiau, wythnosau neu fisoedd	

Mae'r risgiau a restrir isod yn brin.

Mae'r rhifau hyn yn dangos nifer y bobl fesul 10,000.

Beth ddigwyddodd?	Am ba hyd?	Faint? O bob 10,000 o bobl (deg mil o bobl)	
 Niwed i ddannedd	Angen gweld deintydd	Roedd angen i 5 weld deintydd	Nid oedd angen i 9,995 weld deintydd
 Golwg aneglur, llid neu boen yn y llygaid oherwydd crafiad bach neu lygaid sych.	Rhai dyddiau	Tua 5 wedi profi hyn	Tua 9,995 heb brofi hyn
 Goglais, fferdod, poen neu wendid (niwed i'r nerfau).	Dros dro (wythnosau i fisoedd)	1-5 wedi profi hyn	9,995-9,999 heb brofi hyn
	Parhaol	1 wedi profi hyn	9,999 heb brofi hyn
 Adwaith alergaidd difrifol (anaffylacsis)	Yn digwydd yn gyflym Wedi'i drin ar unwaith	1 wedi profi hyn	9,999 heb brofi hyn
 Ataliad ar y galon, ee y galon yn stopio curo yn ystod llawdriniaeth	Wedi'i drin ar unwaith	3 wedi profi hyn	9,997 heb brofi hyn

Mae'r rhifau hyn yn dangos nifer y bobl fesul 100,000.

Beth ddigwyddodd?	Faint? O bob 100,000 o bobl (can mil o bobl)	
 <p>Deffro/dihuno am gyfnod byr o amser yn ystod anesthetig cyffredinol (adennill ymwybyddiaeth ar ddamwain)</p>	<p>5 wedi profi hyn</p> <p>Dyweddod 3–4 o bob 100,000 o bobl bod hyn wedi para llai na phum munud, cyn y llawdriniaeth neu ar ôl iddi ddod i ben.</p> <p>Dyweddod tua 1 o bob 100,000 eu bod wedi teimlo rhywfaint o boen.</p>	<p>99,995 heb brofi hyn</p>
 <p>Wedi colli eu golwg (mynd yn ddall) oherwydd pwysau neu glotiau gwaed yn effeithio ar y nerf optig.</p>	<p>1 wedi profi hyn</p>	<p>99,999 heb brofi hyn</p>
 <p>Wedi marw o gymhlethdodau llawdriniaeth Wedi marw oherwydd ataliad ar y galon yn ystod neu ychydig ar ôl llawdriniaeth Wedi marw oherwydd yr anesthetig</p> <p>Mae'r risg hon yn amrywio'n fawr. Er enghraifft, mae'n uwch ar gyfer rhai llawdriniaethau, neu os oedd pobl yn fregus, yn hŷn neu â chyflyrau iechyd penodol.</p>	<p>14 wedi profi hyn</p> <p>1 wedi profi hyn</p> <p>1 wedi profi hyn</p>	<p>99,986 heb brofi hyn</p> <p>99,999 heb brofi hyn</p> <p>99,999 heb brofi hyn</p>

Ymwadiad

Rydym yn ymdrechu'n galed iawn i sicrhau bod y wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ac yn gyfredol, ond ni allwn warantu hyn. Nid ydym yn disgwyl i'r wybodaeth gyffredinol hon ateb pob cwestiwn a allai fod gennych chi nac i ymdrin â phopeth a allai fod yn bwysig i chi. Dylech drafod eich dewisiadau ac unrhyw bryderon sydd gennych chi â'ch fîm meddygol, gan ddefnyddio'r daflen hon fel canllaw. Ni ddylid trin y daflen hon ar ei phen ei hun fel cyngor. Ni chaniateir ei defnyddio at unrhyw ddiben masnachol neu fusnes. I weld yr ymwadiad llawn, ewch i: (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/welsh).

Caiff pob cyfieithiad ei ddarparu gan gymuned cyfieithwyr Translators without Borders. Caiff ansawdd y cyfieithiadau hyn ei wirio er mwyn sicrhau eu bod mor gywir â phosibl, ond gallai fod gwallau a gallai peth gwybodaeth gael ei chamddechongli.

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

© 2024 Coleg Brenhinol yr Anesthetyddion (Royal College of Anaesthetists) (RCOA)

Caniateir copïo'r wybodaeth hon at ddibenion cynhyrchu deunyddiau gwybodaeth i gleifion. Dyfynnwch y ffynhonnell wreiddiol hon. Os ydych am ddefnyddio rhan o'r wybodaeth hon mewn cyhoeddiad arall, rhaid rhoi cydnabyddiaeth addas a thynnu'r logos, y brandio a'r delweddau. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.