

Anestezice: riscuri și efecte secundare

Leziuni ale dinților, buzelor și limbii

Despre această broșură

Această broșură conține informații despre leziuni ale **dinților, buzelor și limbii** care pot rezulta în urma unei anestezii generale. Explică pe scurt cum pot apărea astfel de leziuni și ce se poate face în această privință.

Anestezicele generale sunt medicamente care produc o stare de somn profund. Sunt esențiale pentru anumite operații și proceduri. În timpul unei anestezii generale, sunteți inconștient(ă) și nu simțiți nimic.

Puteți citi mai multe detalii despre diferitele tipuri de anestezice pe site-ul nostru, care este disponibil în mai multe limbi aici:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Despre leziunile dinților, buzelor și limbii produse în timpul anesteziei

Uneori, puteți rămâne cu mici tăieturi sau vânătăi pe gură și buze după o anestezie. De obicei, acestea se vindecă în câteva zile.

Dinții pot fi ciobiți, slăbiți sau uneori pot ieși accidental în timpul unei anestezii generale.

Când se folosește un anestezic general, mușchii din corp se relaxează, în special cei din jurul gâtului și al pieptului. Acest lucru poate reduce cantitatea de aer care intră în plămâni.

Pentru a asigura un flux continuu de oxigen către plămâni, anestezistul vă poate introduce un tub de respirație în gât, pentru a vă menține căile respiratorii deschise. De obicei, anestezistul face acest lucru după ce sunteți inconștient(ă).

Tuburile sau măștile pe care anestezistul le utilizează în timp ce sunteți inconștient(ă) pot cauza accidental leziuni ale dinților, buzelor și limbii. Acest echipament este necesar pentru a vă menține în siguranță în timpul anesteziei.


Puteți afla mai multe informații privind căile respiratorii și respirația în timpul anesteziei pe site-ul nostru, care este disponibil în mai multe limbi aici:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Care este probabilitatea să apară?

Tăieturi minore sau vânătăi la nivelul buzelor și limbii

Din 100 de persoane




1-5 da

95-99 nu

Leziuni ale dinților care au necesitat intervenția unui dentist

Din 10.000 de persoane



Mai mult de jumătate dintre persoanele care au prezentat leziuni ale dinților aveau dinți și gingii care erau într-o stare precară înainte de operație.

Aceste cifre provin din studii de cercetare. Pe site-ul nostru puteți vedea de unde am obținut datele: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Ce factori pot crește riscul?

Riscul este mai mare dacă:

- nu vă puteți deschide gura foarte larg sau nu vă puteți mișca gâtul cu ușurință. De exemplu, unele afecțiuni artritice pot face dificilă mișcarea gâtului sau poziționarea capului în timpul unei anestezii generale
- aveți dinții superiori foarte proeminenți sau un mandibulă inferioară mai mică
- aveți nevoie de anestezie generală într-o situație de urgență
- aveți nevoie de o cezariană de urgență cu anestezie generală
- suferiți de obezitate sau purtați o greutate suplimentară în jurul gâtului
- trebuie să fiți supus(ă) la o intervenție chirurgicală la nivelul gurii, gâtului, maxilarului sau esofagului (parte a tubului digestiv).

Ce poate ajuta la prevenirea producerii acestora

Puteți face personal câteva lucruri înainte de operație pentru a reduce riscul de producere a unor leziuni ale dinților.

Dacă aveți dinți slăbiți sau gingii care vă dor sau sângerează atunci când vă spălați pe dinți, trebuie să mergeți la medicul dentist imediat ce știți că veți fi supus(ă) unei operații.

Spuneți-i anestezistului dacă:

- aveți dinți slăbiți sau orice altă problemă cu dinții și gingiile
- aveți o proteză detașabilă sau cu benzi elastice
- aveți implanturi, coroane, punți, fațete sau dinți falși
- aveți piercinguri în zona limbii sau buzelor.

Trebuie să-i spuneți anestezistului dacă ați mai fost supus(ă) la vreo anestezie generală în trecut și:

- vi s-a spus că a fost dificilă introducerea tubului în căile respiratorii
- au fost afectați dinții.

Uneori, anestezistul vă poate verifica dosarul medical pentru a înțelege ce a cauzat dificultățile și pentru a evita producerea unor noi leziuni.

Ce se întâmplă dacă dinții mei au leziuni?

Anestezistul vă va anunța dacă dinții v-au fost afectați în timpul operației. Dacă unii dinți au căzut, aceștia vă vor fi returnați. Vi se vor administra analgezice, dacă aveți nevoie, și vi se vor da sfaturi cu privire la ce să faceți în continuare.

Unele spitale au chirurghi dentari care pot examina leziunile și le pot trata. Dacă spitalul la care v-ați operat nu oferă această posibilitate, puteți să mergeți la propriul dentist, apoi să solicitați rambursarea costurilor de la spital. Este recomandat să verificați politica spitalului privind vătămarea dinților în timpul intervenției chirurgicale și să solicitați un formular pentru rambursarea costurilor.

Dacă anestezistul a întâmpinat dificultăți la introducerea tubului în gât sau dacă dinții v-au fost afectați, solicitați un raport scris despre ceea ce s-a întâmplat. Aceste informații ar putea să vă salveze viața, dacă veți avea nevoie de o altă anestezie în viitor.

Societatea pentru Căi Respiratorii Dificile (Difficult Airway Society) gestionează un sistem de Carduri de Alertă pentru Căile Respiratorii (Airway Alert Card). Anestezistul vă poate da o trimitere pentru a lua parte la acest program. Puteți găsi mai multe informații la acest link: <https://das.uk.com/dar>.

Declinarea responsabilității

Ne străduim din răspuțeri să menținem informațiile din această broșură exacte și actualizate, dar nu putem garanta acest lucru. Nu ne așteptăm ca aceste informații generale să acopere toate întrebările pe care le-ați putea avea sau să abordeze toate aspectele care ar putea fi importante pentru dumneavoastră. Ar trebui să discutați cu echipa medicală despre opțiunile dumneavoastră și despre orice îngrijorare pe care o aveți, folosind această broșură ca ghid. Această broșură în sine nu trebuie considerată drept îndrumar. Nu poate fi utilizată în scopuri comerciale sau de afaceri. Pentru precizări legale complete, vă rugăm să faceți clic aici:

[www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian].

Toate traducerile sunt furnizate de comunitatea de traducători a organizației Translators without Borders (Traducători fără frontiere). Calitatea acestor traduceri este verificată pentru ca traducerile să fie cât mai exacte posibil, însă există riscul unor inexactități și al interpretării eronate a anumitor informații.

Spuneți-ne părerea dumneavoastră

Așteptăm sugestiile dumneavoastră pentru a îmbunătăți această broșură.

Dacă aveți observații cu privire la această broșură vă rugăm să le trimiteți la adresa de e-mail: patientinformation@rcoa.ac.uk

Royal College of Anaesthetists

Churchill House, 35 Red Lion Square, Londra WC1R 4SG

www.rcoa.ac.uk

Ediția a șasea, noiembrie 2024

Această broșură va fi revizuită în termen de trei ani de la data publicării.

© 2024 Royal College of Anaesthetists

Această broșură poate fi copiată în scopul producerii de materiale informative pentru pacienți. Vă rugăm să citați sursa originală. Dacă doriți să utilizați o parte din broșură într-o altă publicație, trebuie să specificați sursa în mod adecvat și să eliminați siglele, mărcile, imaginile și pictogramele. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.