

Anesthetig epidwral: risgiau a sgil-effeithiau

Ynglŷn ag anesthetig epidwral

Mae epidwral yn fath o anesthetig sy'n golygu gosod tiwb plastig tenau iawn (cathetr) yn eich cefn. Mae eich anesthetydd yn defnyddio'r cathetr i roi meddyginiaethau i chi i leddfu poen neu i fferru rhan isaf eich corff. Mae'r cathetr yn aros yn eich cefn a gallwch gael mwy o feddyginiaeth lleddfu poen os oes angen.

Defnyddir anesthetig epidwral yn aml i leddfu poen yn ystod genedigaeth i wneud cyfngiadau'n llai anghyfforddus. Mae rhagor o wybodaeth am anesthetig epidwral ar gyfer genedigaeth ar gael ar wefan LabourPains: <https://www.labourpains.org/translated-information/welsh-cymraeg>.

Gellir defnyddio anesthetig epidwral hefyd ar gyfer llawdriniaethau a lleddfu poen ar ôl llawdriniaeth. Mae rhagor o wybodaeth am anesthetig epidwral ar gyfer llawdriniaeth ar gael mewn ieithoedd gwahanol ar ein gwefan:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Ynglŷn â risg ac anesthetig epidwral

Mae pawb yn wahanol ac nid yw'n bosibl gwybod pwy fydd yn profi sgil-ffaith neu risg.

Gall gwybod am risgiau eich helpu i drafod opsiynau â'ch tîm gofal iechyd a gwneud penderfyniadau gwybodus am eich gofal neu'ch cynllun geni.

O ran risg mae'r niferoedd a restrir yn y daflen hon yn niferoedd cyfartalog sy'n dod o astudiaethau ymchwil. Mae rhagor o wybodaeth am yr ymchwil a ddefnyddiwyd gennym yn ein tabl 'Tystiolaeth ar gyfer anesthesia epidwral a risg'. Mae hwn ar gael ar ein gwefan www.rcoa.ac.uk/patientinfo/epidural-evidence-table.

Gall eich risgiau chi fod yn uwch neu'n is na'r niferoedd hyn. Os ydych chi'n ystyried cael epidwral ar gyfer llawdriniaeth, bydd eich anesthetydd yn trafod â chi y risgiau sydd yn fwy tebygol neu'n fwy arwyddocaol i chi.

Os ydych chi'n ystyried cael epidwral pan fyddwch chi'n rhoi genedigaeth, efallai na fyddwch chi'n cyfarfod yr anesthetydd nes eich bod chi yn esgor. Gan fod y broses o esgor yn un anodd ei rhagweld, efallai y byddwch chi'n penderfynu cael anesthetig epidwral hyd yn oed os nad oeddech chi wedi cynllunio ar gyfer hynny. P'un a yw epidwral yn rhan o'ch cynllun geni ai peidio, gall darllen y daflen hon a thaflenni eraill ar wefan LabourPains eich helpu i baratoi ar gyfer yr annisgwyl a meddwl am unrhyw gwestiynau a allai godi.


Risg ac anesthetig epidwral wrth roi genedigaeth

Yn ôl y dystiolaeth ddiweddaraf ynghylch anesthetig epidwral:

- **nid yw'n** ei gwneud hi'n fwy tebygol y bydd angen i chi gael toriad Cesaraidd
- **nid yw'n** gwneud defnyddio gefeiliau neu ventouse[†] yn fwy tebygol
- **nid yw'n** gwneud eich babi'n gysglyd nac yn achosi niwed hirdymor iddo
- **nid yw'n** achosi poen cefn ar ôl rhoi genedigaeth.

Gall dewis epidwral i leddfu poen yn ystod esgor helpu i leihau'r siawns o gymhlethdodau difrifol, fel gwaedu trwm (gwaedlif), heintiau, clotiau gwaed neu'r angen angen am ofal dwys.

[†]Offer a ddefnyddir i helpu i arwain babi allan yn ystod genedigaeth drwy'r wain.



Anesthetig epidwral: risgiau a sgil-ffeithiau

Gall anesthetig epidwral wneud rhoi genedigaeth yn fwy diogel:

- os ydych chi'n byw â gordewdra
- os oes gennych chi broblemau iechyd presennol
- os ydych chi'n disgwyl mwy nag un babi
- os yw eich babi yn gymamserol (yn cael ei eni'n gynnar).

Beth sy'n digwydd os nad yw'r anesthetig epidwral yn gweithio?

Nid yw anesthetig epidwral bob amser yn gweithio cystal ag y dylai ac weithiau nid yw'n gweithio o gwbl. Mae'n cymryd tua 20 munud i'w osod a hyd at 30 munud cyn i chi deimlo'r effaith lawn. Os nad yw'n gweithio'n dda i chi, dywedwch wrth eich bydwraig neu'ch anesthetydd. Maen nhw'n gallu:

- rhoi mwy o anesthetig i chi drwy gathetr
- gofyn i chi newid ystum eich corff
- symud y cathetr i fan arall yn eich cefn (ail-leoli)
- awgrymu math gwahanol o anesthetig.

O bob 100 o bobl a gafodd anesthetig epidwral wrth esgor



Roedd angen
meddyginiaeth lleddfu
poen ychwanegol ar tua
10 yn ogystal â'r epidwral

90 heb brofi
hyn



I tua 5 bu'n rhaid ail-
leoli'r epidwral

95 heb brofi
hyn

Risgiau a sgil-ffeithiau sy'n gysylltiedig ag anesthetig epidwral


Mae'r rhifau hyn yn dangos nifer y bobl fesul pob 100 a gafodd epidwral.

Beth ddigwyddodd?		Am ba hyd? A yw'n bosibl ei drin?	Faint? O bob 100 o bobl (cant o bobl)
	Cur pen/pen tost (yn dilyn niwed i'r dwra)	Gall hyn ddigwydd rhwng diwrnod ac wythnos ar ôl cael anesthetig epidwral. Gall fod yn ysgafn a gwella o fewn ychydig ddyddiau gyda meddyginiaeth lleddfu poen dros y cownter, neu gall fod yn ddifrifol a golygu bod angen triniaeth yn yr ysbyty. Mae rhagor o wybodaeth am gur pen/pen tost yn dilyn niwed i'r dwra ar gael ar ein gwefan: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/headache-spinal-epidural	0.5–1 wedi profi hyn 99–99.5 heb brofi hyn
	Twymyn	Gall ddigwydd yn yr oriau ar ôl cael epidwral a phara am ychydig ddyddiau. Efallai y bydd eich tîm gofal iechyd yn cynnig gwrthfotigau i chi os yw'n cael ei achosi gan haint.	1–10 wedi profi hyn 90–99 heb brofi hyn

	Pwysedd gwaed isel a oedd angen ei drin	Gall ddigwydd ar unwaith a phara am ychydig oriau, yn fuan ar ôl yr anesthetig epidwral. Gall wneud i chi deimlo'n sâl, yn benysgafn neu'n gysglyd. Gall eich tîm gofal iechyd roi meddyginiaeth i chi i wella eich pwysedd gwaed.	 5-30 wedi profi hyn 70-95 heb brofi hyn
	Teimlo'n sâl (cyfogyd)	Gall ddigwydd ar unwaith a phara am ychydig oriau, yn fuan ar ôl yr anesthetig epidwral. Gall eich tîm gofal iechyd roi meddyginiaethau gwrthgyfog i chi os bydd hyn yn digwydd.	 5-20 wedi profi hyn 80-95 heb brofi hyn
	Cosi	Gall ddigwydd ar unwaith ac fel arfer mae'n diflannu ymhen awr neu ddwy. Gall eich tîm gofal iechyd roi meddyginiaeth i chi i drin y cosi.	 Tua 30 wedi profi hynTua 70 heb brofi hyn
	Anhawster wrth basio wrin	Efallai na fyddwch chi'n gallu teimlo bod angen i chi fynd i'r toiled ar ôl cael anesthetig epidwral. Weithiau mae'r tîm gofal iechyd yn argymhell gosod cathetr wrinol, tiwb tenau i ddraenio'r wrin yn uniongyrchol o'ch pledren. Efallai y bydd hwn yn gael ei gadw i mewn tan y diwrnod wedyn.	


Mae'r risgiau a restrir isod yn brin.

Mae'r rhifau hyn yn dangos nifer y bobl fesul 1,000.


Beth ddigwyddodd?		Am ba hyd? A yw'n bosibl ei drin?	Faint? O bob 1,000 o bobl (mil o bobl)
	Gwenwyndra anesthetig lleol (gormod o anesthetig yn eich llif gwaed). Gall hyn arwain at gymhlethdodau difrifol fel ffitiau neu ataliad ar y galon (pan fydd y galon yn rhoi'r gorau i guro)	Mae'r rhain yn gymhlethdodau difrifol. Bydd eich tîm yn eich trin yn gyflym os bydd hyn yn digwydd.	Tua 1 wedi profi hyn Tua 999 heb brofi hyn

Anesthetig epidwral: risgiau a sgil-ffeithiau


Mae'r rhifau hyn yn dangos nifer y bobl fesul 20,000.

Beth ddigwyddodd?	Am ba hyd? A yw'n bosibl ei drin?	Faint? O bob 20,000 o bobl (ugain mil o bobl)
 Gwendid, diffyg teimlad, pinnau bach yn eich coes, eich pen-ôl neu'ch troed (niwed i'r nerfau)	Niwed dros dro (dyddiau neu wythnosau) sydd fel arfer yn gwella ar ei ben ei hun. Niwed parhaol.	8 wedi profi hyn 19,992 heb brofi hyn Tua 1 wedi profi hyn Tua 19,999 heb brofi hyn

Mae'r rhifau hyn yn dangos nifer y bobl fesul 50,000.

Beth ddigwyddodd?	Am ba hyd? A yw'n bosibl ei drin?	Faint? Allan o bob 50,000 o bobl (pum deg mil o bobl)
 Symptomau meningitis yw cur pen/pen tost, twymyn a chwydu	Gall haint meningitis ddigwydd ddyddiau neu wythnosau ar ôl yr anesthetig epidwral. Gellir defnyddio gwrthfotigau i'w drin.	1 wedi profi hyn 49,999 heb brofi hyn

Mae'r rhifau hyn yn dangos nifer y bobl fesul 200,000.

Beth ddigwyddodd?	Am ba hyd? A yw'n bosibl ei drin?	Faint? Allan o bob 200,000 o bobl (dau gan mil o bobl)
 Haint yn neu o amgylch yr asgwrn cefn	Mae'n digwydd ddyddiau neu wythnosau ar ôl cael yr anesthetig epidwral. Mae'n cael ei drin â gwrthfotigau neu weithiau â llawdriniaeth i ddraenio'r crawniad.	2 wedi profi hyn 199,998 heb brofi hyn
 Clot gwaed o amgylch yr asgwrn cefn (hematoma fertebraidd)	Mae hwn yn gymhlethdod difrifol a all olygu bod angen llawdriniaeth frys. Gall achosi parlys yn y coesau os na chaiff ei drin yn gyflym.	1-2 wedi profi hyn 199,998 heb brofi hyn

Anesthetig epidwral: risgiau a sgil-ffeithiau

Mae'r rhifau hyn yn dangos nifer y bobl fesul 500,000.

Beth ddigwyddodd?		Faint? Allan o bob 500,000 o bobl (pum can mil o bobl)	
	Cael eich parlysu	2 wedi profi hyn hyn	499,998 heb brofi hyn

Mae rhagor o wybodaeth am y risg o niwed i nerfau ar ôl cael anesthetig epidwral neu asgwrn cefn ar gael yma: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/nd-after-spinal-epidural.

rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk



© 2025 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

Caniateir copio'r wybodaeth hon at ddibenion cynhyrchu deunyddiau gwybodaeth i gleifion.
Dyfynnwch y ffynhonnell wreiddiol hon. Os ydych am ddefnyddio rhan o'r wybodaeth hon mewn cyhoeddiad arall, rhaid rhoi cydnabyddiaeth addas a thynnu'r logos, y brandio a'r delweddau. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.